

Asimetrinės laikysenos priežastys ir paplitimas tarp ikimokyklinio (6–7 metų) amžiaus vaikų (1994)

Vadovė - doc. dr. Nijolė Dailidienė

Atsakinga vykdytoja - Vida Juškelienė

1994 m. buvo atliktas vaikų laikysenos tyrimas, kurio tikslas – nustatyti asimetrinės laikysenos paplitimą ir priežastis tarp Vilniaus ikimokyklinio (6–7 metų) amžiaus vaikų. Tyrimo rezultatai parodė, kad 46,9 proc. tirtųjų buvo asimetrinės laikysenos. Nustatyta, kad asimetrinei laikysenai formuotis įtakos turėjo kūdikystėje persirgtas rachitas, dažnas ūmus sergamumas ir per mažas judėjimo aktyvumas. Vaikų, sirgusių II^o rachitu, santykinės rizikos rodiklis OR yra 2,76 (PI 1,62–4,72), palyginti su rachitu nesirgusiais vaikais; vaikų, sirgusių 16–28 kartus, OR=3,97 (PI 2,48–6,36) lyginant su tais, kurie per savo gyvenimą sirgo iki 8 kartų. Mažiausiai judančių vaikų, kurių judėjimo aktyvumas anketoje įvertintas 13–22 balais, OR=2,44 (PI 1,21–4,91), lyginant su gavusiais 33–37 balus. Gauti rezultatai skatina aktyviau taikyti rachito ir ūmaus sergamumo profilaktines priemones, daugiau dėmesio skirti ikimokyklinio amžiaus vaikų judėjimo aktyvumui. Tyrimo duomenys panaudoti rengiant metodines rekomendacijas ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams ir tėvams (Dailidienė N., 1996), podiplominio tobulinimo programas pedagogams. Tyrimo rezultatai publikuoti „International Journal of Epidemiology“ (1996).