

Bendra informacija ASPĮ dėl remdesiviro paskirstymo, skyrimo sergantiesiems COVID-19 liga gydyti bei apskaitos

Remdesiviras (*Veklury 100 mg*) skiriamas suaugusiųjų ir paauglių (12 metų ir vyresnių, sveriančių ne mažiau kaip 40 kg), sergančių 2019 m. koronavirusine liga (COVID-19), gydymui, kai pasireiškus pneumonijai būtina mažos tekmės deguonies terapija (t.y. deguonis yra skiriamas per nosines kaniules arba kauke). Rekomenduojama gydymo trukmė 5 d.

Remdesivirą centralizuotai įsigija Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC). Iš ESSC remdesiviras yra paskirstomas COVID-19 ligos gydymo procesą organizuojančioms ASPĮ (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė), kurios organizuoja sergančiųjų COVID-19 gydymą regione ir skiria remdesivirą kitoms (atraminėms ASPĮ). Kitos ASPĮ, gydančios sergančiuosius COVID-19 liga, dėl remdesiviro skyrimo turi kreiptis į pirmiau išvardintas organizuojančias ASPĮ pagal savo regioną.

Prašome visų ASPĮ, kurios skiria gydymą remdesiviru pacientams su patvirtinta COVID-19 liga, informaciją apie per praėjusią parą suvartotą remdesiviro flakonų skaičių bei gydomų pacientų skaičių pateikti kasryt užpildant atitinkamą klausimyną, kurį kas ryt siunčiate į Valstybinę ligonių kasą, dalį “Gydymas remdesiviro vaistiniu preparatu”. Ši informacija padės numatyti remdesiviro įsigijimo ir paskirstymo ASPĮ poreikį bei leis užtikrinti sklandų ASPĮ aprūpinimą šiuo vaistiniu preparatu.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

SAM Farmacijos politikos skyrius

Remdesiviro skyrimo rekomendacijos gydant pacientus su patvirtinta COVID-19 liga

Rekomendacijos parengtos ir patvirtintos Darbo grupės vaistinių preparatų įsigijimo poreikiui įvertinti pasitarimo metu (2020 m. spalio 15 d. protokolas Nr. LP-245)

Remdesiviras skiriamas suaugusiųjų ir paauglių (12 metų ir vyresnių, sveriančių ne mažiau kaip 40 kg), sergančių 2019 m. koronavirusine liga (COVID-19), gydymui, kai pasireiškus pneumonijai būtina mažos tekmės deguonies terapija (t.y. deguonis yra skiriamas per nosines kaniules arba kauke). Gydymo trukmė 5 d.

Nerekomenduojama remdesivirą pradėti skirti pacientams, kuriems yra taikoma neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija; tais atvejais, kai neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija pradeda taikyti anksti (per 5-7 dienas nuo simptomų pradžios), dėl remdesiviro paskyrimo sprendžiama individualiai, šiais atvejais taip pat rekomenduojama atmesti kitas kvėpavimo nepakankamumo priežastis. Pacientams, kuriems neinvazinės ar invazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis išsivystė jau pradėjus skirti remdesivirą, rekomenduojama toliau skirti remdesivirą tol, kol baigsis 5 dienų kursas.

Remdesiviro skyrimas esant kepenų pažeidimams

Remdesiviro negalima pradėti skirti pacientams, kuriems gydymo pradžioje alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą.

Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:

- Gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą. Jį galima pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršutinę normos ribą viršija < 5 kartus.

ARBA


- Padidėjus ALT aktyvumui atsiranda ir kepenų uždegimo požymių ar simptomų arba didėja konjuguoto bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės aktyvumas arba tarptautinis normalizuotas santykis (TNS)

Remdesiviro skyrimas esant inkstų funkcijos nepakankamumui

Prieš pradėdant gydymą remdesiviru ir per visą remdesiviro vartojimo laiką visiems pacientams reikia vertinti aGFG, atsižvelgiant į klinikinį poreikį. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių aGFG < 30 ml/min.

COVID-19 ligos sukeltos pneumonijos gydymo algoritmas

Algoritmas parengtas ir patvirtintas Darbo grupės vaistinių preparatų išsigijimo poreikiui įvertinti pasitarimo metu (2020 m. spalio 15 d. protokolas Nr. LP-245)



* Spręsti dėl dalyvavavimo klinikiniam tyrimui.

**Kai COVID-19 simptomų trukmė yra <5-7 dienos ir hospitalizavus iškart yra *high-flow* / DPV indikacijos, spręsti dėl remdesiviro skyrimo individualiai; ieškoti kitų / papildomų kvėpavimo nepakankamumo priežasčių.