

Prostatos vėžys (PV)

Didelė svarba

Vidutinė svarba

Maža svarba

Ambulatoriniai vizitai

- Simptomų turinčių pacientų pirmas vizitas arba pacientai su didelės apimties metastatine liga;
- nauji pacientai su agresyvia metastatine liga ar smulkių ląst. prostatos vėžiu;
- pacientai su sunkiais gydymo šalutiniais reiškiniais.

- Mažos apimties metastatinė liga;
- Asimptominiai pacientai su radiologiškai įtariamą ligos atkryčiu;
- Simptominių pacientų sisteminio gydymo pradžia.

- Pacientai, kuriems skirta ADT ar kita taikinių terapija;
- Aktyvaus stebėjimo vizitai.

Diagnostiniai tyrimai

- Ūminiai simptomai kuriems reikia skubaus radiologinio ištyrimo.

- Tyrimai, kurie reikalingi gydymo pakeitimui, ar turi reikšmės ligos valdymui.

- Ūminiai simptomai kuriems reikia skubaus radiologinio ištyrimo.

Didelė svarba

Vidutinė svarba

Maža svarba

- Dauguma prostatektomijų gali būti atidėtos.
- Didelės rizikos pacientams svarstyti ST vietoj chirurginio gydymo

- ADT pradėjimas esant progresuojančiam, lokaliai pažengusiam simptominiam ar metastazavusiam hormonams jautriam PV;
- Metastazavusio kastracijai atsparaus vėžio I-os eilės simptominis gydymas kartu su ADT, kai gydymo pradžios atidėjimas greičiausiai turės įtakos bendram išgyvenamumui;
- ChT greitai progresuojančiam PV/ simptominiams pacientams, kurie nėra jautrūs ADT.

- Hipofrakcionuota ST esant simptomams (pvz. skausmingos kaulų MTS).

- Į androgenų receptorių nukreipto preparato pridėjimas prie ADT, esant metastazavusiam hormonams jautriam PV;
- Lėtai progresuojanti I-os eilės kastracijai atspari metastazavusi/pasikartojanti liga;
- Veikiantys preparatai nemetastazavusiam kastracijai atspariam PV.

- Į androgenų receptorių nukreipto preparato pridėjimas prie ADT, esant metastazavusiam hormonams jautriam PV;
- Lėtai progresuojanti pirmos eilės kastracijai atspari metastazavusi/pasikartojanti liga;
- Androgenų receptorių veikiantys preparatai nemetastazavusiam kastracijai atspariam PV.

- Pratešti neoadj. ADT skyrimą, kol bus galima skirti ST.