



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-910 „DĖL CENTRALIZUOTAI
APMOKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m.

d. Nr. V-

Vilnius

P a k e i ĉ i u Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.7.	Monokloniniai antikūnai metastazavusiam gaubtinės arba tiesios žarnos vėžiui gydyti	Bevacizumab	C18–C20	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas. Skiriamas 1) pirmaeiliam metastazavusio storosios ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui, kartu taikant chemoterapiją. Vėliau taikoma monoterapija; 2) antraeiliam metastazavusio gaubtinės ar tiesiosios žarnos vėžio gydymui	ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	220–290“
-------	---	-------------	---------	--	--	----------

2. Pakeičiu 1.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.21.	Interleukino inhibitoriai sisteminiam jaunatviniam (juveniliniam) artritui ir jaunatviniam (juveniliniam) poliartritui gydyti	Tocilizumab	M08.20 – M08.29, M08.3	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik vaikų ligų gydytojas arba gydytojas reumatologas. Šis vaistinis preparatas skiriamas vaikams nuo 2 metų iki 6 metų amžiaus, jei gydymas tumoro nekrozės faktoriaus	ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas	8–12“
--------	---	-------------	------------------------	---	---	-------

				alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas		
--	--	--	--	---	--	--

3. Papildau 1.40 papunkčiu:

„1.40.	Interleukino inhibitoriai ir selektyvūs imunosupresantai poliartikulinės eigos jaunatviniam idiopatiniam artritui gydyti	Tocilizumab	M08.20 – M08.29, M08.3	Gydymą pradėti ir tęsti gali gydytojas reumatologas. Šis vaistinis preparatas skiriamas, jei gydymas tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas arba kontraindikuotinas 6 metų ir vyresniems vaikams	ASPI, turinti licenciją teikti III lygio stacionarines vaikų reumatologijos paslaugas	20–40 ⁶⁶
		Abatacept				

4. Papildau 1.41 papunkčiu:

„1.41.	Monokloniniai antikūnai kiaušidžių ir kiaušintakių piktybiniam navikui gydyti	Bevacizumab	C56, C57.0	Gydymą pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas. Skiriamas tik derinyje su paklitakseliu suaugusioms pacientėms, kurioms nustatytas platinos preparatams atsparus recidyvavęs epitelinis kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminio pilvaplėvės vėžys, kurioms buvo skirti ne daugiau kaip du chemoterapijos deriniai ir kurioms anksčiau nebuvo skirtas gydymas bevacizumabu ar kitais KEAF inhibitoriais arba į KEAF receptorius veikiančiais preparatais.	ASPI, turinti licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas	20 ⁶⁶
--------	---	-------------	------------	---	--	------------------

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Parengė

Elita Radkevič, tel. 219 3332