

PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTUI OSIMERTINIB (TAGRISSO), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS

1. Duomenys apie vaistinį preparatą:

Vaisto bendrinis pavadinimas	Osimertinib
ATC kodas	L01XE35
Vaisto prekinis pavadinimas	Tagrisso 40mg N30; Tagrisso 80mg N30;
Farmacinė forma	Plėvele dengtos tabletės
Skirtas	Ambulatoriniam gydymui <input checked="" type="checkbox"/>
	Stacionariniam gydymui <input type="checkbox"/>
	ar gydymui dienos stacionare <input type="checkbox"/>

2. Siūlomos indikacijos, apribojimai

Indikacijos pavadinimas:	Broncho ir plaučio piktybinis navikas
Ligos kodas	C34
Siūlomi apribojimai	Lokaliai progresavęs arba metastazavęs nesmulkiąstelinis plaučių vėžys (NSLPV) su T790M mutacija, kai gydymo EGFR TKI metu ar po jo liga progresavo.

Siūlomas kompensavimo lygis:

100 proc. ;

90 proc. ;

80 proc. ;

50 proc. .

Apmokėti centralizuotai .

3. Kompensuojamųjų arba centralizuotai apmokamų vaistų nuo ligos arba sindromo, kuriems gydyti siūloma į atitinkamą sąrašą įrašyti naują vaistą, bendrinis pavadinimas*	ATC kodas	2017 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidos (Eur)	2017 m. pacientų skaičius
Cyclophosphamidum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01AA01	684	20
Cyclophosphamidum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo (lygiagretus importas)	L01AA01	716	17
Pemetrexedum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BA04	1 298 313	155
Gemcitabinum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC05	118 650	251
Vincristinum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CA02	632	28
Vinorelbinum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01CA04	2 974	2
Vinorelbinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CA04	7 967	32
Etoposidum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CB01	7 237	61
Paclitaxelum 10 mg, injekciniai, paprasto veikimo	L01CD01	12 854	26
Docetaxelum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CD02	45 308	118
Doxorubicinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01DB01	2 712	29
Cisplatinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01XA01	20 433	279
Carboplatinum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01XA02	16 878	134
Gefitinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE02	908 252	83
Erlotinibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE03	194 888	21
Afatinibum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE13	116 247	14
Nintedanibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE31	224 179	46
Nintedanibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XE31	57 533	17
Topotecanum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L01XX17	1 412	2
Topotecanum 1 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01XX17	7 634	17
Megestrolum 1 g, geriamieji, skysti	L02AB01	42 846	373
Megestrolum 1 g geriami kieti	L02AB01	130	1
Filgrastimum, Lenograstimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	195 339	394
Filgrastimum, Lenograstimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA10	625	3
Bevacizumab	L01XC07	889 871	38
*Pastaba: pateikiama informacija apie 2017 m. kompensuotus antinavikinius ir imunomoduliuojančius vaistus (ATC kodas L) plaučių piktybiniam navikui gydyti			
4. Statistinis gyventojų skaičius Lietuvoje*	2 847 904		

*Pastaba: 2017 m. gyventojų skaičius

5. Planuojamo gydyti pacientų skaičiaus apskaičiavimas:

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė	Pacientų skaičius			Pastabos ir duomenų šaltinis
		pirmieji metai	antrieji metai	trečiai metai	
Ligotumas	123,5	3516	3823	4130	Higienos instituto duomenimis 2017 m. Lietuvoje gyveno 3516 asmenys, sergantys bronchų ir plaučių (C34) vėžiu
Sergamumas	54,0	1538	1538	1538	Higienos instituto duomenimis 2017 m. Lietuvoje buvo diagnozuota 1538 nauji bronchų ir plaučių (C34) vėžio atvejai
Mirtingumas	43,2	1231	1231	1231	2017 m., Higienos instituto duomenimis, 1231 pacientai nuo plaučių, trachėjos, bronchų (C33, C34) vėžio mirė
Prognozuojamas metinis tam tikros ligos atvejų skaičius		3823	4130	4437	
		100%	108%	116%	Pacientų metinis procentinis augimas
	85%	1307	1360	1412	Nesmulkiąstelėtinis vėžys sudaro apie 85 proc. visų plaučių vėžio atvejų (šaltiniai: ESMO, Mayo Clin Proc., 2008)
Pacientų, kuriems gydymas galėtų būti skiriamas pagal registruotą (-as) vaisto indikaciją (-as), skaičius		107	113	120	Informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, 2017 m. EAFR tirozinkinazės inhibitoriai buvo skirti 107 pacientams, 2017 m., lyginant su 2016 m. pacientų skaičius paaugo 6 proc., prognozuojama, kad kiekvienais metais pacientų skaičiaus augimas bus panašus.
Pacientų, kuriems vaistas galėtų būti skiriamas atsižvelgiant į jo skyrimo pagal registruotas indikacijas apribojimus, skaičius	60%	32	34	36	Ligos progresavimo po EGFR TKI terapijos metu apie 60% pacientų nustatyta T790M mutacija EGFR koduojančiame gene (paraiškos informacija). Prognozuojama, kad apie pusei šių pacientų būtų skiriamas Osimertinib. Prognozuojant pacientų skaičius taip pat remtasi SMC vertinimu: osimertinib (Tagrisso®) (kur gamintojo prognozuojama, kad tinkami gydymui būtų 51 pacientas), perskaičiavus pagal Lietuvos gyventojų skaičiaus proporciją.
Prognozuojamas pacientų, kurie kasmet nutrauks gydymą vaistu, skaičius	0%	0	0	0	Prognozuojama, kad paciento gydymui bus skiriamas vidutiniškai 11 mėn. gydymo kursas.
Planuojamas gydyti pacientų skaičius		32	34	36	

9. Prognozuojamos PSDF biudžeto išlaidos jau kompensuojamiems ar centralizuotai apmokamiems vaistams, jei siūlomas vaistas nebūtų įrašytas į atitinkamą sąrašą:

Kompensuojamųjų arba centralizuotai apmokamų vaistų nuo ligos arba sindromo, kuriems gydyti siūloma į atitinkamą sąrašą įrašyti naują vaistą, bendrinis pavadinimas	Pirmieji metai	Antrieji metai	Tretieji metai	Pastabos
<i>Docetaxel</i> <i>Pemetrexed</i> <i>Nintedanib</i>	167 576	177 631	188 289	

10. Prognozuojamų PSDF biudžeto išlaidų pokytis, jei vaistas būtų įrašytas į atitinkamą sąrašą:

Į atitinkamą sąrašą įrašomo vaisto bendrinis pavadinimas	Pirmieji metai	Antrieji metai	Tretieji metai	Pastabos
<i>Osimertinib</i>	2 076 944	2 201 561	2 333 655	